


# COUNTRY G 2012

## Trwała łąka

Intensywne użytkowanie kośne lub przemienne na stanowiskach średnich do dobrych.

## Profil

Zimotrwałe gatunki traw jak kostrzewa łąkowa, tymotka, kupkówka i wiechlina łąkowa sprawiają, że mieszanka jest solidna, natomiast koniczyna czerwona i biała dostarczając dodatkową ilość  N zwiększają plon białka. Późna życica trwała podnosi koncentrację energii w paszy.

- Zimotrwała dzięki, tymotce, wiechlinie i kostrzewie łąkowej
- Późna życica trwała podnosi koncentrację energii
- Koniczyna czerwona i biała przyswajają N atmosferyczny

DynaSeed
Seed Technology by DSV



DSV

## Skład

| | |
|---|---|
| 30% | życica trwała (późna)<br>Hurricane, Valerio |
| 20% | Tymotka łąkowa<br>Aturo |
| 20% | Kostrzewa łąkowa<br>Baltas |
| 10% | Wiechlina łąkowa<br>Liblue |
| 5% | życica trwała (wczesna) |
| 5% | Kupkówka pospolita<br>Revolin |
| 5% | koniczyna biała<br>Bianca, Liflex |
| 5% | Koniczyna czerwona<br>Harmonie, Milvus, Taifun |

## Forma wysiewu

Nowy zasiew

## Stanowiska

| | |
|---|---|
| Suche | ● ● ○ |
| Normalne | ● ● ● |
| Wilgotne | ● ● ● |
| Murszowe | ● ● ○ |
| Górzyste | ● ● ● |

## Użytkowanie

| | |
|---|---|
| **Pastwiskowe** | + ○ ○ |
| **Kośno-pastwiskowe** | + + + |
| **Kośne** | + + + |
| **Ekstensywne** | — ○ ○ |

+++ = szczególnie polecana | ++ = polecana | + = ograniczone stosowanie | - = brak danych

## Wskazówki uprawowe

| | |
|---|---|
| **Nowy zasiew** | 35 - 40 kg/ha |
| **Podsiew** | 20 - 25 kg/ha |
| **Użytkowanie w ciągu roku** | 3 - 4 |

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 07/2023 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.